

( الصف الأول )

### تطعيم ضد مرض الحصبة و الحصبة الألمانية و النكاف (أبو دغيم) وجدرى الماء

قد تحدث للبعض من متلقي التطعيم واحدة أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية :

أعراض موضعية : احمرار، و ألم موضعي ، و انتفاخ في موقع التطعيم (الحقن) .

أعراض عامة : ارتفاع درجة حرارة الجسم ، و ظهور طفح خفيف على الجلد من اليوم الرابع وحتى اليوم الثاني عشر ، بعد تلقي التطعيم.

ومن النادر أن تظهر الأعراض الجانبية التالية : التهاب شعب التنفس العلوية ، و رشح ، و انتفاخ الغدد الليمفاوية و اللعابية ، و فقدان الشهية ، و إسهال ، و تقيؤ ، و نعاس ، و إرهاق ووهن.

### تطعيم ضد الانفلونزا

ردود الفعل الموضعية : قد يحدث انتفاخ ، و ألم في موضع التطعيم (الحقن)، احمرار.

ردود الفعل العامة هي : ارتفاع درجة الحرارة ، بحة في الصوت أو سعال أو تهيج في العينين أو وجع في العضلات أو الرأس أو الحكّة أو الاعياء و التي تستمر يوماً أو يومين.

في حال حدوث أي من هذه الأعراض عليكم إخبار الممرض بذلك.

للأطفال الذين لم يتلقوا حتى اليوم وجبتين على الأقل من تطعيم الانفلونزا ، يجب استعمال الوجبة الثانية من هذا التطعيم في صندوق المرضى (كوبات حوليم) ، وذلك بعد 4 أسابيع على الأقل من إعطاء الوجبة الأولى ، من الممكن استكمال هذه الوجبة بأي تطعيم مسجل ضد الانفلونزا.

( الصف الثاني )

### تطعيم ضد مرض الخناق، و الكزاز، و السعال الديكي و شلل الأطفال

قد تحدث للبعض من متلقي التطعيم واحدة أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية :

أعراض موضعية : احمرار، و ألم موضعي ، و انتفاخ في موقع التطعيم (الحقن) .

أعراض عامة : ارتفاع درجة حرارة الجسم (عادة معتدلة) ، و غثيان ، و تقيؤ ، و فقدان شهية ، و دواران ، و إسهال ، و أوجاع رأس ، و نعاس ، و عصبية .

ومن النادر أن ترتفع درجة حرارة الجسم أعلى من 39.5 درجة مئوية.

( الصف الثامن )

### تطعيم ضد مرض الخناق، و الكزاز، و السعال الديكي

قد تحدث للبعض من متلقي التطعيم واحدة أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية :

أعراض موضعية : احمرار، و ألم موضعي ، و انتفاخ في موقع التطعيم (الحقن) .

أعراض عامة : ارتفاع درجة حرارة الجسم (عادة معتدلة) ، و غثيان ، و تقيؤ ، و فقدان شهية ، و دوار ،

و إسهال ، و وجع رأس ، و نعاس ، و عصبية .

ومن النادر أن ترتفع درجة حرارة الجسم أعلى من 39.5 درجة مئوية.